

## Programa de vacunación recomendado para niños y adolescentes del estado de Nueva York

Una palomita ✓ significa que esa es la fecha a partir de la cual puede vacunar a su hijo y el mejor momento para hacerlo. Si a su hijo no lo vacunan en el "mejor momento", deberá vacunar lo antes posible. Pregúntele a su médico sobre cómo poner a su hijo al día con las vacunas.

Vacuna contra:	Edad							
	Nacimiento	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18-24 meses	4-6 años	11-12 años
Hepatitis A					✓	✓		
Hepatitis B	✓	✓ 1-4 meses		✓ 6-18 meses	Recomendado para cualquier niño que no esté vacunado contra la Hepatitis B.			
Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)		✓	✓	✓	✓ 12-18 meses		✓	
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)		✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ 12-15 meses			
Polio (IPV)		✓	✓	✓ 6-18 meses			✓	
Neumococo (PCV7) <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓ 12-15 meses	Pregúntele a su médico si su hijo de 2 años o más debe vacunarse contra la PPV23. <sup>2</sup>		
Sarampión, paperas, rubéola (MMR)					✓ 12-15 meses		✓	
Varicela					✓ 12-15 meses		✓	Se recomienda una segunda dosis de refuerzo para niños que sólo recibieron una dosis.
Rotavirus		✓	✓	✓ <sup>1</sup>				
Tétano, difteria y tos ferina (Tdap)								✓ 11-18 años
Enfermedad meningocócica (MCV4) <sup>3</sup>						Pregúntele a su médico si su hijo de 2 años o más debe vacunarse contra la MCV4. <sup>3</sup>		✓
Virus del papiloma humano (HPV)								✓ <sup>4</sup>
Influenza				Recomendado anualmente para niños de 6 meses en adelante. Pregúntele a su médico si su hijo debe recibir una o dos dosis.				

<sup>1</sup> Para ciertos tipos de Hib y Rotavirus, no se requiere la dosis de 6 meses

<sup>2</sup> PCV7 = Vacuna Neumocócica Conjugada; PPV23 = Vacuna Neumocócica Polisacárida

<sup>3</sup> MCV4 = Vacuna Meningocócica Conjugada

<sup>4</sup> La vacuna contra el HPV se aplica en tres dosis, en un período de 6 meses.